




Ciech
Sarżyna



**PRODUKTY
CIECH SARŻYNA**



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



HERBICYDY

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
CHWASTOX EXTRA® 300 SL	MCPA 300 g/l	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, gorczyca polna, kurzyślak polny, wilczomlecz obrotny	3	od początku fazy krzewienia do jej końca (BBCH 21–29)
CHWASTOX® COMPLEX 260 EW	MCPA 200 g/l, chlopyralid 20 g/l, fluoksypyr 40 g/l	pszenica ozima	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity	2–3	od początku fazy krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 21–32)
		trawniki, boiska sportowe, pola golfowe	babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jastrzębiec kosmaczek, konieczyna biała, konieczyna drobnogłówkowa, konieczyna łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona, prosienicznik szorstki, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna	2,5	od wiosny do wczesnej jesieni
			babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, konieczyna biała, konieczyna drobnogłówkowa, konieczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienicznik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna	3,5	
CHWASTOX TURBO® 340 SL	MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l	jęczmień jary, owies, pszenica jara, pszenżyto jare	gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne	2	od początku fazy krzewienia do jej końca (BBCH 21–29)
		pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	2,5	
CHWASTOX® 750 SL	MCPA 750 g/l	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies	bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polne	0,75	od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21–29)
		jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto		1	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		jabłoni			
CHWASTOX® D 179 SL	MCPA 161 g/l, dikamba 17,8 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	5	od początku fazy krzewienia do jej końca (BBCH 21–29)
		jęczmień jary, pszenica jara, owies	chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślak polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne	4,5	

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg,l/ ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL	MCPA 200 g/l, mekoprop-P 150 g/l, dikamba 40 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziwienik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospo- lity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, niezapominajka polna, dym- nica pospolita, iglica pospolita	2	od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21–29)
		jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenżyto jare	gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, rumian polny, dym- nica pospolita, szarłat szorstki	1,5	
		trawniki, boiska spor- towe, pola golfowe	jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny	2	od wiosny do wczesnej jesieni, na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 14–40)
CHWASTOX® UNIWERSALNY 60 SG	MCPA 600 g/kg	pszenica ozima	dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziwienik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	1–1,25	od początku krzewienia do fazy 3. kolanka (BBCH 21–33)
AMBASADOR® 75 WG	amidosulfuron 750 g/kg	pszenica ozima	przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziwienik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku	0,02–0,04	od początku fazy krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 21–32)
FAWORYT® 300 SL	chlopyralid 300 g/l	rzepak ozimy	chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny	0,3–0,4	od początku rozwoju pędów bocznych do początku fazy rozwoju pąków (BBCH 20–50)
		pszenica ozima		0,3–0,4	od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21–29)
		burak cukrowy		0,3	od 2 do 4 liści (BBCH 12–14)
AKAPIT® 125 EC	fluazifop-p-butylu 125 g/l	rzepak ozimy	samosiewy zbóż, wyczyniec polny, miotła zbożowa, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, chwaśnica jednostronna, palusznik krwawy, owies głuchy, włośnica sina, perz właściwy, zycica trwała	3	jesienią od 2 do 8 liści (BBCH 12–18)
		ziemniak			wiosną od ruszenia wegetacji do fazy 5. międzywęźla (BBCH do 35)
		fasola szparagowa		2	od fazy 2. liścia do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu upra- wy międzyrzędowej przed zakryciem międ- dyrzędzi (BBCH 12–40)
		truskawka		3	od fazy 2. liścia do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 12–40)
				3	po zbiorze truskawek (BBCH > 90)
NIKOSAR® 060 OD	nikosulfuorn 60 g/l	kukurydza	chwaśnica jednostronna, fiolek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota pur- purowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	0,5	od 2 do 8 liści (BBCH 12–18)
			chwaśnica jednostronna, fiolek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	0,7	

LABRADOR® EXTRA 50 EC	chizalofop-p etylu 50 g/l	rzepak ozimy	chwaśnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała	0,75–2	jesienią od 2 liści do fazy zielonego pąka (BBCH 12–50)
		burak cukrowy		0,75–2	od fazy 2 liści do zakrycia 50% międzyrzędzi (BBCH 12–35)
		ziemniak		0,75–2	po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 20–34)
		rzepak jary		0,75–2	jesienią od 2 liści do fazy zielonego pąka (BBCH 12–50)
		burak pastewny		0,75–2	od fazy 2 liści do zakrycia 50% międzyrzędzi (BBCH 12–35)
		truskawka		0,75–2	od fazy 1. liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę) lub 91–97 (po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 11–59)
		poziomka		0,75–2	po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia pąków w pachwinach liści do końca fazy, gdy stare liście zamierają (BBCH 91–97)
		cebula uprawiana z siewu		0,75–2	od fazy wyraźnie widocznego 1. liścia właściwego (> 3 cm) do fazy, gdy widocznych jest 9 liści (BBCH 11–19)
		marchew		0,75–2	od fazy rozwiniętego 1. liścia właściwego do fazy, gdy korzeń całkowicie się rozwinie i osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11–49)
		seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna		0,75–2	od fazy 2. liścia właściwego do fazy 5. liścia właściwego (BBCH 12–15)
ALOKSYPYR® 250 EC	fluroksypyr 250 g/l	pszenica ozima	przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, rdest powojowy, wyka ptasia	0,5–0,8	od początku ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 31–37)
		pszenica ozima		0,5–0,8	od początku ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 31–37)
OPAL® 500 SC	chlorotoluron 500 g/l	pszenica ozima	miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tobólki polne, rumian polny, tasznik pospolity, jasnota purpurowa	2	jesienią od fazy 3. liścia do końca krzewienia (BBCH 13–29)
				2,5	wiosną od fazy trzech rozkrzewień do początku wydłużania źdźbła (BBCH 23–30)
SAROKSYPYR® 250 EC	fluroksypyr 250 g/l	pszenica ozima	przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, rdest powojowy, wyka ptasia	0,5–0,8	od początku ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 31–37)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane chwasty*	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
TEZOSAR® 500 SC	terbutyloazyna (terbutylazyna) 500 g/l	kukurydza	fiolek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolity	1	od 2 do 6 liści (BBCH 12–16)
GLIFOHERB® 360 SL	glifosat 360 g/l	pszenica ozima, rzepak ozimy	fiolek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity	4	po zbiorze rośliny uprawnej, przed rozpoczęciem upraw późniejszych
		pszenica ozima		4	przed zbiorem rośliny uprawnej
		rzepak ozimy	chwaśnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	3	przed zbiorem rośliny uprawnej
		jabłoń	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwaśnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, konieczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, mak polny, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, fiolek polny, bodziszek drobny, wierzbownica gruczołowata	3–8	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia		3–8	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		szkółki leśne – sadzonki drzew iglastych i liściastych		2–3	w celu zwalczania chwastów zielonych, krzewiastych i drzewiastych; środek stosować do wysokości metra sadzonki
		odnowienia, zalesienia – sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych	chwaśnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	2–3	w celu zwalczania chwastów zielonych oraz niezdrewniałych odrośli drzew i krzewów; środek stosować do wysokości metra drzewka. W przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego
		ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwaśnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, konieczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłóć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna	5–7,5	od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów
FENUXAR 69 EW	fenoksaprop-p-etylu 69 g/l	pszenica ozima, pszenżyto ozime	miotła zbożowa	1–1,2	od początku krzewienia do fazy 3. kolanka (BBCH 22–33)
		jęczmień jary, pszenica jara	chwaśnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy	0,8–1	od początku krzewienia do fazy 1. kolanka (BBCH 20–31)

NOWOŚĆ

TOSCANA® 75 WG	tribenuron metylu 750 g/kg	pszenica ozima, jęczmień ozimy	mak polny, maruna bezwonna, komosa biała, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, niezapominajka polna	0,02	wiosną do końca fazy krzewienia (do BBCH 29)
AGROSAR® 360 SL	glifosat 360 g/l	pszenica ozima, rzepak ozimy	fiolatek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz włosciwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity	4	po zbiorze rośliny uprawnej, przed rozpoczęciem upraw poziwnych
		pszenica ozima		4	przed zbiorem rośliny uprawnej
		rzepak ozimy	chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	3	przed zbiorem rośliny uprawnej
		jabłoń	babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, konieczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoc kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz włosciwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobółki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, mak polny, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, fiolatek polny, bodziszek drobny, wierzbowica gruczołowata	3–8	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia		3–8	od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu
		szkółki leśne – sadzonki drzew iglastych i liściastych		2–3	w celu zwalczania chwastów zielonych, krzewiastych i drzewiastych; środek stosować do wysokości metra sadzonki
		odnowienia, zalesienia – sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych	chwastnica jednostronna, gwiazd- nica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiot- no kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna	2–3	w celu zwalczania chwastów zielonych oraz niezdrewniałych odrosli drzew i krzewów; środek stosować do wysokości metra drzewka, w przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sązonek i zdrewnieniu pędu szczytowego
		ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych	babka lancetowata, babka zwy- czajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koni- czyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoc kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz włosciwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumia- nek pospolity, stulisz lekarski, szarła- t szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobółki polne, wiechlina roczna, włosnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna	5–7,5	od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów
		torowiska kolejowe		7,5	od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich intensywnego wzrostu
JUZAN 100 SC	mezotriol 100 g/l	kukurydza	fiolatek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna	0,75	od 2 do 8 liści (BBCH 12–18)
			chwastnica jednostronna, fiolatek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku	1,5	

*szerokość spektrum zwalczanych chwastów dla dawki maksymalnej z podanego zakresu dawkowania



FUNGICYDY

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
AZOKSAR® 250 SC	azoksystrobina 250 g/l	pszenica ozima, pszenica jara	mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czern zbóż	0,8–1	od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)
		żyto ozime	rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż		
PROKARB 450 EC	prochloraz 450 g/l	pszenica ozima	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, łamliwość podstawy źdźbła, czern kłosów, seorioza plew, fuzarioza kłosów	1	od początku wydłużania źdźbła do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)
		pszenica jara	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna	1	
		jęczmień jary	brunatna plamistość liści, rynchosporioza, rdza karłowa	1	
		rzepak ozimy	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	1	od początku kwitnienia do fazy początku osiągnięcia typowej wielkości przez łuszczyzny (BBCH 50–71)
		lubin	antraknoza lubinu	0,75–1	od początku kwitnienia do osiągnięcia połowy wielkości przez strąki (BBCH 50–75)
ASKALON 125 SC	flutriafol 125 g/l	pszenica ozima	mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, seorioza plew	1	od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia
		pszenżyto ozime	mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna	1	
		jęczmień jary	mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza	1	
WINDSAR 250 EC	trineksapak etylu 250 g/l	pszenica ozima		0,4	od fazy pełni krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39)
				0,3	od fazy początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) oraz w fazie liścia flagowego (BBCH 39)
		jęczmień ozimy		0,6	od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34)
		żyto ozime		0,3	od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39)
		pszenżyto ozime		0,6	od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32)
		jęczmień jary		0,4	od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32)
		owies siewny		0,4	od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34)
TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW	tebukonazol 250 g/l	pszenica ozima	brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy	0,75–1,25	od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59)
		rzepak ozimy	czern krzyżowych	0,5–0,75	w fazie 4–8 liści (BBCH 14–18)
			sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	0,75–1	w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30–31)
			czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa	1–1,25	od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59–65)

SIARKOL® 80 WG	siarka 800 g/kg	brzoskwinia, morela, śliwa	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10–60 i BBCH 71–86)
		porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest	amerykański mączniak agrestu	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju pędów do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31–60) oraz od początkowej fazy wzrostu owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71–86)
		borówka wysoka, malina	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie przed kwitnieniem (BBCH 41–60), po kwitnieniu (BBCH 71) i po zbiorze owoców (BBCH 91–95)
		truskawka	mączniak prawdziwy	3–5	
		burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	co 10 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak rzekomy dyniowatych	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10–89)
		pomidor, bakłażan uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	1,5–3	stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10–60)
		groch siewny pastewny, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, łubin, bobik, bób	mączniak prawdziwy	1,5	
		kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13–49)
		marchew, pietruszka	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12–49)
		sałata uprawiana w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13–49)
		rzodkiewka uprawiana w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	
		rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista	mączniak prawdziwy	3	
		rośliny zielarskie uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 11–69)
		rośliny ozdobne	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 31–60)
		szkółki leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych	mączniak prawdziwy	1,2–2,4	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10–69)
		jabłoń	mączniak prawdziwy	7,5	co 7 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu 3–5-krotnie w zależności od nasilenia choroby
		winorośl	mączniak prawdziwy	1–4	co 7 dni, zapobiegawczo lub po pojawieniu się objawów choroby

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
SIARKOL® 80 WG	siarka 800 g/kg	burak cukrowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	co 10 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		burak pastewny	mączniak prawdziwy	4–7,5	co 10 dni, zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		rzepak jary	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 2 liści do końca fazy formowania pędów bocznych (BBCH 12–29)
		chmiel	mączniak prawdziwy	3–9	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		grusza	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
SIARKOL® BIS 80 WG	siarka 800 g/kg	rzodkiewka uprawiana w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13–49)
		rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista	mączniak prawdziwy	3	
		pomidor, bakłażan uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	1,5–3	stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy liście są całkowicie rozwinięte, do fazy końca rozwoju kwiatostanu (BBCH 10–60)
		sałata w uprawie polowej, uprawie pod osłonami i uprawie w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 13–49)
		kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 13–49)
		groch siewny pastewny (peluszk), groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona	mączniak prawdziwy	1,5	stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy widoczna jest para łuskowatych liści, do początku fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10–60)
		marchew, pietruszka	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12–49)
		rośliny zielarskie w uprawie polowej, uprawie pod osłonami i uprawie w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
		rośliny ozdobne	mączniak prawdziwy	3–5	
		szkółki leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych	mączniak prawdziwy	1,2–2,4	
		jabłoń	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		winorośl	mączniak prawdziwy	1–4	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		burak cukrowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	
		burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	
		burak pastewny	mączniak prawdziwy	4–7,5	
		rzepak jary	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12–29)
		chmiel	mączniak prawdziwy	3–9	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby

SIARKOL® BIS 80 WG	siarka 800 g/kg	grusza	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		brzoskwinia, morela, śliwa	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy pęknięcia pąków liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10–60) i po zakończeniu kwitnienia do końca rozwoju zalążni (BBCH 69–71)
		porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest	amerykański mączniak agrestu	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju pędów do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 51–60) oraz od początkowej fazy wzrostu owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71–86)
		borówka wysoka, malina	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem (BBCH 41–60), po kwitnieniu od początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) i po zbiorze owoców od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95).
		truskawka	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41–60), po kwitnieniu w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95)
		ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak rzekomy dyniowatych	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 10–89)
SIARKOL® 80 WP	siarka 800 g/kg	jabłoń	mączniak jabłoni	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		winorośl	mączniak prawdziwy	1–4	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		burak cukrowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	
		chmiel	mączniak prawdziwy	3–9	
		borówka wysoka, malina	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem (BBCH 41–60), po kwitnieniu od początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) i po zbiorze owoców od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95)
		grusza	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		brzoskwinia, morela, śliwa	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy pęknięcia pąków liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10–60) i po zakończeniu kwitnienia do końca rozwoju zalążni (BBCH 69–71)
		agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała	amerykański mączniak agrestu	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy pąki są zamknięte w jasnobrązowych łuskach, do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 51–60) oraz w początkowej fazie wzrostu owoców (BBCH 71)
		ogórek, dynia, kawon uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak rzekomy dyniowatych	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy liście są całkowicie rozwinięte, do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 10–60)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
SIARKOL® 80 WP	siarka 800 g/kg	truskawka	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41–60), po kwitnieniu w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95)
		pomidor, bakłażan uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	1,5	stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy liście są całkowicie rozwinięte, do fazy końca rozwoju kwiatostanu (BBCH 10–60)
		groch siewny pastewny (peluska), groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona	mączniak prawdziwy	1,5	stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy widoczna jest para łuskowatych liści, do początku fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10–60)
		marchew, pietruszka	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo, gdy korzenie zaczynają się poszerzać (BBCH > 41) lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		rumianek pospolity, lubczyk ogrodowy uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
		rośliny ozdobne	mączniak prawdziwy	3–5	
		szkółki leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych	mączniak prawdziwy	1,2	
SIARKOL® EXTRA 80 WP	siarka 800 g/kg	jabłoń	mączniak jabłoni	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		winorośl	mączniak prawdziwy	1–4	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		burak cukrowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	
		chmiel	mączniak prawdziwy	3–9	
		grusza	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		brzoskwinia, morela, śliwa	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy pęknięcia pąków liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10–60) i po zakończeniu kwitnienia do końca rozwoju zalążni (BBCH 69–71)
		porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest	amerykański mączniak agrestu	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy pąki są zamknięte w jasnobrązowych łuskach do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 51–60) oraz w początkowej fazie wzrostu owoców (BBCH 71)
		borówka wysoka, malina	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem (BBCH 41–60), po kwitnieniu od początku fazy wzrostu owoców (BBCH 71) i po zbiorze owoców od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95)
		truskawka	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41–60), po kwitnieniu w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych i opadających (BBCH 91–95)
		ogórek, dynia, kawon uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy, gdy liście są całkowicie rozwinięte, do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 10–60)

SIARKOL® 800 SC	siarka 800 g/l	jabłoń	mączniak prawdziwy	6–7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem, po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby
		winorośl	mączniak prawdziwy	2,75–4	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby
		róża uprawiana w polu i pod osłonami	mączniak prawdziwy róży	3	
		burak pastewny, burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy	4–7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy pojawienia się pierwszych liści
		chmiel	mączniak prawdziwy	3–9	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 12–71)
		grusza	mączniak prawdziwy	7,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby od fazy początku wzrostu pędu, do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31–60)
		brzoskwinia, morela, śliwa	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: przed kwitnieniem od fazy pęknięcia pąków liściowych do fazy, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty otwarte (BBCH 10–60); po kwitnieniu od fazy rozwoju zalążni do fazy dojrzewania owoców (BBCH 71–86)
		porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest	amerykański mączniak agrestu	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy rozwoju pędów do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31–60) oraz od początkowej fazy wzrostu owocu do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 71–86)
		truskawka	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w okresie: przed kwitnieniem od początku tworzenia się pędu rozłogowego do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 41–60), po kwitnieniu w fazie rozrostu dna kwiatowego (BBCH 71) i po zbiorze owoców w fazie tworzenia pąków w pachwinach liści do początku zamierania starych liści (BBCH 91–95)
		borówka wysoka, malina	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem od zakończenia fazy wzrostu pędu do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 41–60), po kwitnieniu w fazie początku wzrostu owocu (BBCH 71) i po zbiorze od fazy zakończenia wzrostu pędów do fazy, gdy 50% liści jest przebarwionych lub opadających (BBCH 91–95)
		ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek uprawiane w gruncie, w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak rzekomy dyniowatych	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy liście nie są całkowicie rozwinięte, do pełnej dojrzałości (BBCH 10–89)
		pomidor, bakłażan uprawiane w gruncie, w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	1,5–3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy liście nie są całkowicie rozwinięte, do fazy 9 kwiatostanów (BBCH 10–69)
		groch siewny pastewny, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na zielone nasiona, łubin, bobik, bób	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczna jest para łuskowatych liści, do początku fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10–60)
		kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta chińska, kapusta ozdobna	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 13–49)

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [kg, l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
SIARKOL® 800 SC	siarka 800 g/l	marchew, pietruszka	mączniak prawdziwy	1,5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 2. liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 12–49)
		sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębolistna, rukola, endywia, roszponka, radicchio, cykoria, rukiew uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 13–49)
		rzodkiewka uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 13–49)
		rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3. liścia do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 13–49)
		rośliny zielarskie uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju liści do końca okresu kwitnienia (BBCH 11–69)
		rośliny ozdobne	mączniak prawdziwy	3–5	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu pędu, do fazy pojawienia się pierwszych kwiatów (BBCH 31–60)
		rzepak jary	mączniak prawdziwy	3	zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 3. liścia do końca fazy formowania pędów bocznych (BBCH 12–29)
EKONOM® 72 WP	mankozeb 640 g/kg, metalaksyl 80 g/kg	ziemniak	zaraza ziemniaka	2,5	od fazy 4. liścia do końca kwitnienia (BBCH 14–69)
		winorośl	mączniak rzekomy winorośli	2,5	od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do początku dojrzewania (BBCH 53–81)
		pomidor, osterżyna uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	zaraza ziemniaka	2,5	od fazy rozwiniętego 4. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 14–87)
		tytoń	mączniak rzekomy tytoniu	2,5	pierwszy zabieg wykonać 7 dni po posadzeniu
EKONOM® MM 72 WP	mankozeb 640 g/kg, metalaksyl 80 g/kg	ziemniak	zaraza ziemniaka	2,5	od fazy 4. liścia do końca kwitnienia (BBCH 14–69)
		winorośl	mączniak rzekomy winorośli	2,5	od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do początku dojrzewania (BBCH 53–81)
		pomidor, osterżyna uprawiane w polu, pod osłonami, w szklarni	zaraza ziemniaka	2,5	od fazy rozwiniętego 4. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 14–87)
		tytoń	mączniak rzekomy tytoniu	2,5	pierwszy zabieg wykonać 7 dni po posadzeniu

EKONOM MC® 72,5 WP	mankozeb 680 g/kg, cymoksanil 45 g/kg	ziemniak	zaraza ziemniaka	2	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zawierania się roślin w rzędach; na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych
		pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza	2,4	zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby
		pomidor uprawiany pod osłonami	zaraza ziemniaka	0,3 kg / 100 l wody	
		ogórek uprawiany w polu	mączniak rzekomy dyniowatych	2,5–3	
		ogórek uprawiany pod osłonami	mączniak rzekomy dyniowatych	0,3 kg / 100 l wody	
		cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza	2–2,5	
nowość Rabaate 80 WG	kaptan 800 g/kg	jabłoń	parch jabłoni	1,9 kg/ha	od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (BBCH > 51)
		grusza	parch gruszy	1,9 kg/ha	od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (BBCH > 51)
		wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych	1,9 kg/ha	od końca fazy kwitnienia (BBCH > 69)

ZAPRAWY NASIENNE



ZAPRAWY NASIENNE

Produkt	Substancje aktywne	Roślina uprawna	Zwalczane choroby	Dawka [l, kg / 100 kg]	Dawka wody [l / 100 kg]
RANCONA 15 ME	ipkonazol 15 g/l	pszenica ozima	śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek	0,1	0,5
		pszenica jara	śnieć cuchnąca pszenicy	0,1	0,5
		jęczmień jary, jęczmień ozimy	głownia pyłqca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek	0,133	0,467
BELTONE 25 FS	tritikonazol 25 g/l	pszenica ozima	śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłqca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa	0,15–0,2	0,4
		jęczmień ozimy	głownia pyłqca, pasiastość liści, zgorzel siewek; środek ogranicza występowanie: pleśni śniegowej, plamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż	0,15–0,2	0,4
		pszenżyto ozime	zgorzel siewek, pleśń śniegowa	0,15–0,2	0,4
		żyto ozime	środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek	0,15–0,2	0,4
		pszenica jara	śnieć cuchnąca, zgorzel siewek	0,15–0,2	0,4
		jęczmień jary	głownia pyłqca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa, pasiastość liści	0,15–0,2	0,4
		owies	głownia pyłqca, środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek	0,15–0,2	0,4



NAWOZY DOLISTNE

NAWOZY DOLISTNE

Produkt	Skład			Roślina uprawna	Dawka [l/ha]	Termin aplikacji [faza BBCH]
	Nazwa składnika pokarmowego/pierwiastka	% m/m	g/l			
SARMIN® maKSi	krzem w formie Si	12	150	zboża	0,5	od fazy 3. liścia do fazy trzech rozkrzewień (BBCH 13–23)
						od fazy pełni krzewienia do 2. kolanka (BBCH 26–32)
						od fazy 4. kolanka do końca nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 34–45)
	rzepak ozimy	0,5				od 3 do 8 liści (BBCH 13–18)
						od początku do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 21–29)
						od początku wydłużania pędu do widocznego 6. międzywęźla (BBCH 30–36)
	potas w formie K ₂ O	12	150	burak cukrowy	0,5	od 4 do 8 liści (BBCH 14–18)
						od początku zakrywania międzyrzędzi do 50% zakrycia międzyrzędzi (BBCH 30–35)
						koniec zakrywania międzyrzędzi (BBCH 39)
SARPLON® ZBOŻA	zboża ozime	2				od fazy 3. liścia do początku krzewienia (BBCH 13–22)
						od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 22–29)
						od początku wydłużania źdźbła do początku kłoszenia (BBCH 30–49)
						od końca kwitnienia do pełnej dojrzałości młecznej (BBCH 69–75)
				zboża jare		od fazy 3. liścia do fazy 3. kolanka (BBCH 13–33)
						od fazy liścia flagowego do końca nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45)
						od końca kwitnienia do pełnej dojrzałości młecznej (BBCH 69–75)
	azot (N) całkowity	18,6	245,5			
	azot azotanowy (N-NO ₃)	4,8	63,4			
	azot amonowy (N-NH ₄)	4,7	62			
	azot amidowy (N-NH ₂)	9,1	120,1			
	tlenek potasu (K ₂ O)	2,6	34,3			
	tlenek magnezu (MgO)	0,75	99			
	bor (B)	0,1	1,3			
	miedź (Cu) EDTA	0,5	6,6			
	żelazo (Fe) DTPA	0,1	1,3			
	mangan (Mn) EDTA	1,5	19,8			
SARPLON® RZEPAK	rzepak ozimy	2				od 4 do 8 liści (BBCH 14–18)
						od początku rozwoju pędów bocznych do końca wydłużania pędu (BBCH 21–39)

SARPLON® RZEPAK	azot (N) całkowity	21,6	285,1	rzepak ozimy	2	od 4 do 8 liści (BBCH 14–18)
	azot azotanowy (N-NO ₃)	5,6	73,9			
	azot amonowy (N-NH ₄)	5,4	71,3			
	azot amidowy (N-NH ₂)	10,6	139,9			od początku rozwoju pędów bocznych do końca wydłużania pędu (BBCH 21–39)
	tlenek potasu (K ₂ O)	2,3	30,4			
	tlenek magnezu (MgO)	0,94	12,4			
	trójtlenek siarki (SO ₃)	0,11	1,5			od początku rozwoju pąków do fazy żółtego pąka (BBCH 50–59)
	bor (B)	0,4	5,3			
	miedź (Cu) EDTA	0,18	2,4			
	żelazo (Fe) DTPA	0,18	2,4			
	mangan (Mn) EDTA	1,27	16,8			
	molibden (Mo)	0,04	0,5			od końca kwitnienia do osiągnięcia przez 50% łuszczyn typowej wielkości (BBCH 67–75)
	cynk (Zn) EDTA	0,18	2,4			
SARPLON® KUKURYDZA	azot (N) całkowity	20,5	270,6	kukurydza	2	od 1 do 2 liści (BBCH 11–12)
	azot azotanowy (N-NO ₃)	5,3	70			
	azot amonowy (N-NH ₄)	5,5	72,6			
	azot amidowy (N-NH ₂)	9,7	128			od 3 do 5 liści (BBCH 13–15)
	tlenek potasu (K ₂ O)	0,9	11,9			
	tlenek magnezu (MgO)	1,4	18,5			
	bor (B)	0,3	4			
	miedź (Cu) EDTA	0,1	1,3			powyżej 7 liści (BBCH > 17)
	żelazo (Fe) DTPA	0,1	1,3			
	mangan (Mn) EDTA	0,5	6,6			
	molibden (Mo)	0,035	0,5			
	cynk (Zn) EDTA	1,5	19,8			
SARPLON® UNIWERSALNY	azot (N) całkowity	22,8	301	ziemniaki buraki cukrowe warzywa rośliny sadownicze rośliny strączkowe rośliny ozdobne	2	w warunkach intensywnego wzrostu lub z chwilą zaobserwowania objawów niedoboru
	azot azotanowy (N-NO ₃)	6	79,2			
	azot amonowy (N-NH ₄)	6	79,2			
	azot amidowy (N-NH ₂)	10,8	142,6			
	tlenek potasu (K ₂ O)	0,8	10,6			
	tlenek magnezu (MgO)	1,5	19,8			
	bor (B)	0,2	2,6			
	miedź (Cu) EDTA	0,2	2,6			
	żelazo (Fe) DTPA	0,1	1,3			
	mangan (Mn) EDTA	0,4	5,3			
	molibden (Mo)	0,04	0,5			
	cynk (Zn) EDTA	0,3	4			

ZBOŻA

PROGRAM OCHRONY I NAWOŻENIA


FAZY ROZWOJOWE WG SKALI BBCH



PROGRAM OCHRONY I NAWOŻENIA RZEPAK OZIMY

FAZA ROZWOJOWA WG SKALI BBCH


HERBICYDY FUNGICYDY NAWOZY DOLISTNE



PROGRAM OCHRONY I NAWOŻENIA KUKURYDZA

FAZY ROZWOJOWE WG SKALI BBCH

HERBICYDY NAWOZY DOLISTNE





Ciech

Sarzyna

CIECH SARZYNA S.A.
ul. Chemików 1
37- 310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl