



ROZSZERZONY
ZAKRES STOSOWANIA

LABRADOR®

EXTRA 50 EC

SKONCENTROWANY
NA ZWALCZANIU CHWASTÓW



- **Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty** jednoliścienne w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego i ziemniaka.
- **Działanie systemiczne** – jest transportowany do korzeni i rozłogów chwastów.
- **Możliwość stosowania od wczesnych faz** rozwojowych.



Chwasty jednoliścienne rosnące w uprawach rolniczych negatywnie wpływają na jakość i ilość plonów. Konkurują z rośliną uprawną o światło, wodę i składniki pokarmowe. Wpływają negatywnie na jej pokrój – rzepak ozimy poddany silnej presji ze strony samosiewów zbóż intensywnie rośnie w górę. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne zwłaszcza jesienią, gdy rośliny rzepaku ozimego z wyniesionym wysoko pękiem wierzchołkowym są bardziej podatne na wymarzenie. Duże nasilenie chwastów jednoliściennych sprzyja nadmiernemu zagęszczeniu łanu rośliny uprawnej, a tym samym stwarzane są lepsze warunki do infekcji grzybowych. Rośliny jednoliścienne również mogą być źródłem infekcji.

Zawartość substancji czynnej:


Chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego).




DZIAŁANIE NA CHWASTY:

Labrador[®] Extra 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie po wschodach chwastów. Środek Labrador[®] Extra 50 EC, pobrany przez liście, przemieszczany jest do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po upływie około 7 dni, a pełny efekt w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po około 2–3 tygodniach. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.


BURAK CUKROWY



RZEPAK OZIMY



ZIEMNIAK



Gatunek chwastu	Dawka		
	0,75 l/ha	1,5 l/ha	2,0 l/ha
Samosiewy zbóż			
Chwastnica jednostronna			
Miotła zbożowa			
Owies głuchy			
Wiechlina zwyczajna			
Włośnica sina			
Włośnica zielona			
Życica trwała			
Perz właściwy			

chwasty wrażliwe

Uprawa	Dawka [l/ha]	Faza stosowania [BBCH]
Rzepak ozimy		12 – 50
Burak cukrowy		13 – 35
Ziemniak		20 – 34
Rzepak jary		12 – 50
Burak pastewny		12 – 35
Truskawka		11 – 59 91 – 97
Poziomka	0,75 – 2,0	91 – 97
Cebula uprawiana z siewu		11 – 19
Marchew		11 – 49
Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna		12 – 15
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona		14 – 19
Fasola szparagowa		13 – 21

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

① 691 387 257

② 691 387 255

③ 691 387 256

④ 609 125 506

⑤ 695 802 177

⑥ 669 600 219

⑦ 669 600 654

⑧ 515 219 461

⑨ 695 802 160

⑩ 667 770 608

⑪ 669 600 227

⑫ 609 125 506



CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel.: +48 (17) 24 07 111
fax: +48 (17) 24 07 122
e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
www.ciechagro.pl

facebook.com/CiechSarzyna



youtube.com/CiechSarzyna

