

CHWASTOX[®]

SKUTECZNY SPOSÓB WALKI Z CHWASTAMI.





A wide-angle photograph of a grain field, likely wheat or barley, stretching to the horizon. The sky is a mix of blue and orange, suggesting a sunset or sunrise. The grain is in sharp focus in the foreground, with some motion blur, giving a sense of a gentle breeze. The overall mood is peaceful and agricultural.

CHWASTOX[®]

PRODUKTY NUMER 1 W POLSCE
WŚRÓD HERBICYDÓW ZBOŻOWYCH

CHWASTOX[®]

NR 1 WŚRÓD HERBICYDÓW ZBOŻOWYCH



- **Szybkie działanie** na chwasty.
- **Szerokie spektrum** zwalczanych chwastów.
- **Brak uodpornień chwastów** na długotrwałe stosowanie produktu.
- Znakomicie nadaje się do mieszanin.

*polecam
Gregorz Bardowski*

www.ciechagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.





NOWOŚĆ

CHWASTOX Complex 260 EW

10



NOWOŚĆ

CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL

12



CHWASTOX Trio 540 SL

14



CHWASTOX Turbo 340 SL

16



CHWASTOX Extra 300 SL

18



CHWASTOX 750 SL

20



CHWASTOX D 179 SL

22



SUBSTANCJE AKTYWNE W PRODUKTACH CHWASTOX

MCPA i MCPP-P należą do jednych z najlepszych substancji aktywnych w ochronie roślin przed zachwaszczeniem. Są to uzyskane w sposób syntetyczny pochodne kwasu fenoksyoctowego (działające podobnie jak IAA). Takie związki są wytwarzane przez rośliny np. auksyny. Ich stężenie jest utrzymywane przez procesy metaboliczne

na odpowiednim, korzystnym dla rośliny poziomie. Dostarczenie z zewnątrz dodatkowej porcji tych kwasów wymaga od rośliny wykorzystania mechanizmów regulujących jego stężenie. Sprawność tej regulacji jest zróżnicowana pomiędzy gatunkami roślin. To zjawisko zostało wykorzystane w zwalczaniu chwastów.

BRAK UODPORNIEŃ

Stosując MCPA i MCPP-P po prostu „oszukujemy” wrażliwe rośliny (chwasty), które „akceptują” cząsteczki wprowadzonych fenoksykwasów, „sądząc”, że to niezbędny element metabolizmu. Nie uruchamiają więc procesów obronnych

i nie dochodzi do zjawiska uodporniania się roślin na te związki. Równocześnie rośliny usiłują skorygować stężenie do właściwego dla gatunku rośliny. Dla roślin wrażliwych proces ten jest wyniszczający przez co giną.

EFEKTY

MCPA i MCPP-P stosowane w zalecanym terminie – od początku do końca krzewienia roślin jednoliściennych – nie uszkadzają zbóż ozimych, zbóż jarych, plantacji traw nasiennych oraz łąk i pastwisk. Te rośliny uprawne są obojętne na podwyższone

stężenie fenoksykwasu i dysponują sprawnym mechanizmem jego regulacji. Nie wykazują one również ujemnych reakcji. Zaletą każdej substancji czynnej jest szerokie spektrum zwalczanych chwastów.

MIESZANINY

Obie substancje (MCPA i MCPP-P) mogą być stosowane łącznie, a także w mieszaninach z innymi regulatorami wzrostu jak np.: 2,4-D, 2,4-DB, bromoksynil, chlopypirid, dikamba,

dichloroprop-p, fluroksypyr. W mieszance z produktem Agrosar 360 SL MCPA pomaga w zwalczaniu, jakże uciążliwego skrzypu polnego.

DZIAŁANIE

Do zalet MCPA i MCPP-P należy zaliczyć termin wykonywania zabiegów nalistnych, przypadający na chwasty znajdujące się w fazie 2–6 liści właściwych. Pomaga to rozpoznać gatunki i odpowiednio dobrać optymalnie działający produkt CHWASTOX. Po użyciu produktów zmiany w wyglądzie chwastów (np. deformacje blaszek liściowych, skręcanie, staśmienie i pękanie łodyg oraz ogonków liściowych) zaczynają

być widoczne w krótkim czasie. Świadczą one o rozpoczęciu oczekiwanego procesu chwastobójczego. Uszkodzenia te przechodzą w nekrozy kończące się całkowitym zamieraniem roślin. Na chwastach średnio wrażliwych i starszych można również zaobserwować takie objawy. Ulegają silnemu zahamowaniu wzrostu i rozwoju, przez co zmniejsza się ich konkurencyjność w stosunku do rośliny uprawnej.

INNOWACJA

Na wysoką jakość produktów CHWASTOX wytwarzanych w CIECH Sarzyna S.A. wpływa technologia produkcji pozwalająca uzyskać produkt pozbawiony zanieczyszczeń.

Tak doskonałe parametry mają wpływ na wysoką skuteczność działania na chwasty i precyzyjną selektywność w stosunku do roślin uprawnych, dla których jest zalecany.

PRODUKTY CHWASTOX

CHWASTOX to najpopularniejsza na polskim rynku marka środków ochrony roślin. Od lat jest liderem na rynku środków chwastobójczych, ciesząc się zasłużonym powodzeniem wśród rolników. Doskonale sprawdza się w wielu uprawach. Zawiera w swoim składzie substancję aktywną MCPA, której skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania zostało zweryfikowane


przez lata obecności na całym świecie. Korzystny stosunek ceny do jakości, wysoka skuteczność, szybkość działania, brak zjawiska uodpornienia się chwastów są wystarczającymi argumentami przemawiającymi na korzyść tej substancji aktywnej.

PRODUKTY CHWASTOX TO:

1. Innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych MCPA i MCPP-P.
2. Wyższe bezpieczeństwo dla środowiska.
3. Wygodna forma użytkowa w postaci koncentratu pozwalająca:
 - a. w łatwy sposób sporządzić ciecz użytkową,
 - b. dokładnie rozprowadzić substancję aktywną w opryskiwaczu.
4. Szeroka gama produktów CHWASTOX pozwala na właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od typu zachwaszczenia uprawy.
5. Produkty CHWASTOX działają szybko, co jest szybko widoczne w postaci więdnących liści i całych roślin.
6. Wygodna i bezpieczna formuła nie naraża na pylenie, pozwala na łatwe i szybkie mieszanie z innymi środkami.
7. Produkty CHWASTOX wykazują bardzo dobrą selektywność w stosunku do roślin chronionych.
8. Oprócz podstawowej roli ochronnej produkty CHWASTOX są często używane do wiosennych zabiegów uzupełniających.



CHWASTOX TO PRODUKT NR 1 W POLSCE



*źródło danych: Market Share Kleffman Group



CHWASTOX[®] COMPLEX 260 EW to unikatowy herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej. Odpowiednio skomponowany - zawiera MCPA, chlopyralid i fluroksypyr. Połączenie trzech substancji aktywnych gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych.


Zawartość substancji aktywnych:

MCPA (substancja z grupy aktywnych fenoksy kwasów) - 200 g/l (18,25%)

Chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 20 g/l (1,82%)

Fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 40 g/l (3,65%)





UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA IŁOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica ozima	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity.	1	3,0 l/ha	200 - 300 l/ha	Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32).
	Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny.	1	3,0 l/ha	200 - 300 l/ha	
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe	Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona, prosienicznik szorstki, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna.	1	2,5 l/ha	200 - 500 l/ha	Środek stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 10°C. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych oraz w przypadku silnego zachwaszczenia zwłaszcza takimi chwastami jak: babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, przetacznik polny i rogownica polna. W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.
	Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski.	1	2,5 l/ha	200 - 500 l/ha	
	Chwasty odporne: bluszcz kurdybanek, krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik ożankowy.	1	2,5 l/ha	200 - 500 l/ha	
	Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienicznik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna.	1	3,5 l/ha	200 - 500 l/ha	
	Chwasty średnio odporne: krwawnik pospolity, przetacznik perski.	1	3,5 l/ha	200 - 500 l/ha	
	Chwasty odporne: bluszcz kurdybanek, powój polny, przetacznik ożankowy.	1	3,5 l/ha	200 - 500 l/ha	
	Chwasty wrażliwe: bluszcz kurdybanek, bodziszek drobny i powój polny.	2*	3,5 l/ha	200 - 500 l/ha	

* Odstęp pomiędzy zabiegami co najmniej 56 dni

CHWASTOX[®]

NOWY TRIO 390 SL


NOWOŚĆ



CHWASTOX NOWY TRIO 390 SL to środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym.

Zawartość substancji czynnych:

MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 200 g/l (16,7%)
mekoprop-P w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 150g/l (12,5%)
dikamba – w formie soli potasowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) 40 g/l (3,3%)



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica ozima	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	1	2,0 l/ha	200–300 l/ha	Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21–29)
	Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny	1	2,0 l/ha	200–300 l/ha	
Jęczmień jary	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)	1	1,5 l/ha	200–300 l/ha	Opryskiwać od początku krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21–29)
	Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, przytulia czepna, samosiewy rzepaku	1	1,5 l/ha	200–300 l/ha	
	Chwasty średnio odporne: fiołek polny	1	1,5 l/ha	200–300 l/ha	

CHWASTOX

TRIO® 540 SL



CHWASTOX TRIO 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.




Zawartość substancji czynnych:

mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%)

dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	Chwasty wrażliwe: komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne	1	2 l/ha	200-300 l/ha	Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
	Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny	1	2 l/ha	200-300 l/ha	
	Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne	-	-	-	
Jęczmień jary, owies	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, tobołki polne	1	1,5 l/ha	200-300 l/ha	Zabieg wykonać od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
	Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna	1	1,5 l/ha	200-300 l/ha	
	Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa	1	1,5 l/ha	200-300 l/ha	
	Chwasty odporne: fiołek polny i chwasty jednoliścienne	-	-	-	
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe	Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), szczaw polny (może odrastać po zabiegu), szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne	2*	2 l/ha	500 l/ha	Chwastox Trio 540 SL stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 40). W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu
	Chwasty średnio odporne: przetacznik perski	2*	2 l/ha	500 l/ha	
	Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy	-	-	-	

* odstęp pomiędzy zabiegami - co najmniej 56 dni

CHWASTOX

TURBO® 340 SL




CHWASTOX TURBO 340 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych.



Zawartość substancji czynnych:

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (25,9%).
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4%).



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, tobołki polne, rumian polny*, gorczyca polna*	1	2,5 l/ha	200–300 l/ha	Opryskiwać wiosną, od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21–29)
	Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny	1	2,5 l/ha	200–300 l/ha	
Jęczmień jary, owies	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne, gorczyca polna*	1	2 l/ha	200–300 l/ha	Opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 21–29)
	Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, przetacznik rolny, rdest powojowy, przetacznik perski, szarłat szorstki	1	2 l/ha	200–300 l/ha	

* Przy użyciu mieszaniny Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

CHWASTOX


EXTRA[®] 300 SL



CHWASTOX EXTRA 300 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednoročných chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.



Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziomnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne	1	3 l/ha	200-300 l/ha	Zabieg wykonać wiosną, od początku krzewienia zbóż do końca tej fazy
	Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mak polny	1	3 l/ha	200-300 l/ha	
	Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty, szarłat szorstki	1	3 l/ha	200-300 l/ha	
	Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa	-	-	-	

CHWASTOX[®]

750 SL




CHWASTOX 750 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.



Zawartość substancji czynnych:

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZALECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziomnik szorstki, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne	1	0,75 l/ha	200–300 l/ha	Zabieg wykonać wiosną, od początku krzewienia zbóż do końca tej fazy
	Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty	1	0,75 l/ha	200–300 l/ha	
	Chwasty odporne: bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna	-	-	-	
Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziomnik szorstki, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne	1	1 l/ha	200–300 l/ha	Zabieg wykonać wiosną, od początku krzewienia zbóż do końca tej fazy
	Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty	1	1 l/ha	200–300 l/ha	
	Chwasty odporne: bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik polny, chwastnica jednostronna	-	-	-	

CHWASTOX

D[®] 179 SL




CHWASTOX D 179 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych, jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.



Zawartość substancji czynnych:

MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%)
dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoowego) - 17,8 g/l (1,64%)



UPRAWA	SKUTECZNOŚĆ	LICZBA ZABIEGÓW	MAKSYMALNA DAWKA	ZAŁECANA ILOŚĆ WODY	TERMIN STOSOWANIA
Pszenica ozima	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity	1	5 l/ha	200-300 l/ha	Opryskiwać wiosną, od początku do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej
	Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik polny	1	5 l/ha	200-300 l/ha	

DZIAŁ SPRZEDAŻY AGRO

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

① 691 387 257

② 691 387 255

③ 691 387 256

④ 669 600 220

⑤ 669 600 475

⑥ 669 600 219

⑦ 669 600 654

⑧ 691 387 258

⑨ 695 802 160

⑩ 667 770 608



PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI DS. GOSPODARSTW ROLNYCH

① 669 600 227

② 669 600 667

③ 609 125 506



CIECH Sarzyna S.A.

Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

tel.: +48 (17) 24 07 111

fax: +48 (17) 24 07 122

e-mail: sarzyna@ciechgroup.com

www.ciechagro.pl

facebook.com/CiechSarzyna



youtube.com/CiechSarzyna

